

Die
Gastrectasie

mit Berücksichtigung der Fälle welche in den Jahren
1880, 1881 und 1882 auf der II. med. Abtheilung
in München zur Beobachtung gekommen,

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der Doktorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn Obermedicinalrathes

PROF. DR. V. ZIEMSEN

ord. ö. Professor etc.

der

hohen medicinischen Fakultät

der k. Ludwigs-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Christian Hager

cand. med. von Kaltbrunn (Ct. St. Gallen).

München, 1884.

K. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Die
Gastrectasie

mit Berücksichtigung der Fälle welche in den Jahren
1880, 1881 und 1882 auf der II. med. Abtheilung
in München zur Beobachtung gekommen,

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der Doktorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn Obermedicinalrathes

PROF. DR. V. ZIEMSEN

ord. ö. Professor etc.

der

hohen medicinischen Fakultät

der k. Ludwigs-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Christian Hager

cand. med. von Kaltbrunn (Ct. St. Gallen).

München, 1884.

K. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Gewidmet
seinen lieben Eltern

in

K a l t b r u n n

(Ct. St. Gallen).



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Geschichtliches.

Wenn wir an der Hand der Literatur die Geschichte dieses Krankheitsprozesses verfolgen, so finden wir, daß die „Gastrectasie“ schon einem Fabricius ab Aquapendente (1574), einem Spigelius (1623) bekannt war. Im Jahre 1679 berichtet Bonet von einem Magen, der bis zum Schambein reichte; 1749 erzählt Widmann von einem Pyloruscarcinom mit sekundärer Magenerweiterung.

Wesentliche Fortschritte in Erkenntniß und Behandlung der Gastrectasie verdanken wir Canstatt (1855). 1869 war es Kufsmann, der durch eine Arbeit über Ectasie des Magens das Interesse der Aerzte und Pathologen in höherem Maße zu heben wußte; aus dieser Zeit entspringt die wissenschaftliche Methode der Magenausspülung.

Weiterhin haben v. Ziemssen, Leube, Rosenbach die Erkenntniß der Gastrectasie und die Therapie gefördert; ihre Namen mögen hier nur erwähnt sein, um später deren einzelne Ansichten kennen zu lernen.

Aetiologie.

Die Gastrectasie kann ihren Ursprung finden:

1) in einem gesteigerten Widerstande. Da die tiefste Stelle des Magens tiefer liegt, wie der Pylorus und zudem der Mageninhalt durch den engen Kanal geführt werden muß, so muß im gefunden Magen schon dieser Widerstand überwunden werden und das ist der normale Widerstand. Die Steigerung des Widerstandes kann bestehen in angeborner Verengerung des Pylorus oder erworben durch Narbenbildung; durch pseudo-

plastische Verengung oder durch einfache Hypertrophie des Pylorus, wie dies beim chronischen Katarrh vorkommt. Das Hinderniß kann auch im Duodenum gelegen sein in Form von Pseudoplasmen, die eine Compression auf den Darmabschnitt ausüben.

Nach Bartels¹⁾ zahlreichen Beobachtungen bewirkt die Dislocation der rechten Niere nach vorn und innen durch Druck auf die zwischen Hilus renalis dexter und Wirbelsäule herabsteigende nicht bewegliche pars descendens eine Verlegung des Lumens des Duodenum und nachträglich Erweiterung des Magens. Müller-Warneke²⁾ hat die Möglichkeit der Verschiebung der Niere durch starke Umschnürung des Thoraxabschnittes durch Versuche an der Leiche nachgewiesen.

Kufsmaul³⁾ spricht über Fälle von Magenerweiterung, auf der vertikalen Stellung des Magens beruhend, die öfter bei Weibern, als bei Männern angetroffen wird und die in den meisten Fällen durch festes Schnüren entsteht, indem die Leber und der bewegliche Pylorustheil des Magens nicht nur nach unten, sondern auch nach links hinübergedrängt wird; dadurch Disposition zu Atonie und mäßiger Ectasie. Was für verschiedene Ursachen eine Stenosis pylori bewirken können, beweist ein Fall, der von Leichtenstern⁴⁾ veröffentlicht ist. Die klinische Diagnose lautete auf Carcinoma ventriculi, verleitet durch den harten, fühlbaren Tumor; die Obduction ergab ein Conglomerat von Kirschkernen in der hochgradig hypertrophischen Pars pylorica, welche laut Anamnese schon 4 Monate im Magen verweilten.

Der Widerstand kann aber auch gesteigert werden durch Vergrößerung der Last. Kufsmaul nimmt an, daß durch Ueberlastung des Magens eine Knickung zwischen dem horizontalen

¹⁾ Berl. klin. Wochenschrift 1877.

²⁾ Berl. klin. Wochenschrift 1877 p. 429.

³⁾ Volkmann's klin. Vorträge Nr. 181 (1880).

⁴⁾ Deutsch. med. Wochenschrift 1882 p. 730.

und vertikalen Theile des Duodenum durch Zug und Zerrung zu Stande kommt. Diese Möglichkeit ist geboten, bei Vielleffern, Säuern. Bei Dyspepsie, beim chronischen Katarrh gehen die Substanzen in Folge gestörter Sekretion abnorme Zerfetzungen ein, bleiben längere Zeit im Magen liegen; es kommen starke Gasentwicklungen zu Stande, welche die Muskelfasern ausdehnen und ihre Contraktion schwächen.

Aus demselben Grunde ist daher eine Magenectasie auch bei einem Diabetiker leicht erklärlich. Die großen Flüssigkeitsmengen, die er täglich zu sich führt, haben eine Ueberladung des Magens und diese an sich eine Widerstandssteigerung zur Folge. Jedoch nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Nahrung, wie grobe, wie große oder sonst unverdauliche Stücke können dieselben Erscheinungen bewirken.

2. Schädigende Urfachen der austreibenden Kraft des Magens, wie: Typhus, Cholera, Puerperalprocese, Tuberculose, Anämie und Chlorose. Erkrankungen der Muskulatur durch Herzfehler, Leber- und Pfortadererkrankungen, Morbus Brightii; Zerstörung der Muskelfasern durch Bindegewebsneubildung, wie lange Katarrhe, Carcinom, Geschwüre. Störung der Contractilität der Fasern bei Fixirung des Magens in Folge Verwachsungen. Durch veränderten Nerveneinfluss, wie: Hirn- und Rückenmarkskrankheiten, Peritonealexsudate nach Traumen auf die Bauchwand. Zumal bei Hysterischen kommen die Lähmungszustände in der Magenmuskulatur und in Folge dessen Insufficienz des Pylorus nicht selten zur Beobachtung. Die Pyloruschleimhaut kann anaesthetisch sein oder die Reflexauslösung fehlen.

Folgen der Contractilitätsstörungen sind wieder Stagnation des Mageninhalts, Vermehrung der Luft, Dyspepsie. Bei der Anämie werden die Muskelfasern atonisch und contractionsunfähig; es besteht mangelhafte Sekretion und Resorption.

Längerer Mißbrauch alkoholischer Getränke führt bekanntlich zu chronischem Magenkatarrh mit Verlangsamung und Be-

einträchtigung der Verdauung. Bei gestörten Resorptions- und Sekretionsverhältnissen der Magenschleimhaut bleibt die normale Umsetzung der Ingesta aus; eine Entleerung des Mageninhaltes findet wenigstens nicht so schnell wie nöthig statt; die excessive Anhäufung der Speisen bedingt starke Gasentwicklung und sekundär entsteht die Dilatation.

Leube¹⁾ spricht auch von einer „nervösen Dyspepsie“. Die Krankheit zeigt die Erscheinungen des chronischen Magenkatarrhs, resp. des *Ulcus ventriculi*, ist aber trotzdem weit von jener Krankheit verschieden. Die unvermittelte Aufnahme der vollen Thätigkeit des Magens könne nicht ohne mächtige Rückwirkung auf seine Nerven und schliesslich auf das Gesamtnervensystem bleiben. Würden nun diese nervösen Begleitererscheinungen der Verdauung über die Norm gesteigert, so erhalte man das Bild der „nervösen Dyspepsie“, wo die gesteigerte Erregbarkeit der Magennerven den Kern der Krankheit bilde. Die Ursachen dieser pathologischen Steigerung sind entweder abnorme Art der Reize (chronischer Magenkatarrh, *Ulcus*, Carcinom) oder die dyspeptischen Erscheinungen haben nur im Nervensystem und abnormer Erregbarkeit ihre Basis, indem kein anatomischer Grund dafür gefunden werden kann. Die Neuralgien und Hyperaesthesien des Magens sind am exquisitesten bei jungen Mädchen in Folge Menstruationsstörungen, welch' letztere vorzüglich durch Chlorose und Anaemie bedingt sind.

Rosenbach gibt der Ursache, welche die Ectasie zur Folge hat, den allgemeinen Namen „Mageninsuffizienz“. Wenn die austreibenden Kräfte der vergrößerten Last oder dem vermehrten Widerstand am Pylorus nicht mehr gewachsen sind, dann erfolgt die Entleerung nicht mehr innerhalb der normalen Zeit und es liegt die Gefahr nahe, dass jede frische Mahlzeit den Magen bereits mehr oder minder angefüllt findet. Die mechanische Leistungsfähigkeit des Magens wird mehr

¹⁾ Deutsch. Arch. für klin. Medicin XXIII. Bd. p. 98.

beansprucht und da sie vermindert ist, wird früher oder später ein Zustand dauernder Ueberfüllung folgen.

Kussmaul leitet die Ectasie von einer „Atonie“ ab. Nach ihm ist die Magenectasie eine Folge gestörter Ernährung der Muskulatur, welche Störung eine Abschwächung der Peristaltik und Widerstandsfähigkeit der Magenwandung bedingt.

Es ist aber nicht absolut nothwendig, dafs bei verengtem Pylorus die Magenwände sich ausdehnen; es kann auch bis zu einer gewissen Grenze eine kompensirende Hypertrophie der Muskularis bestehen. Cruveilhier¹⁾ berichtet über die Section eines 68 Jahre alten Mannes, bei welchem ein Gallertkrebs des Magens die Regio pylorica einnahm und hochgradig verengte und trotzdem fehlten intra vitam alle Symptome der Retention des Mageninhaltes.

Dafs auch die Störung der Muskelthätigkeit des Pylorus bei der Magenectasie eine grofse Rolle spielt, leuchtet in Kenntnifs der Anatomie und Physiologie klar ein. Indem nach Rüdinger²⁾ die Längsfasern der portio pylorica durch ihre Contraktion den transversalen Durchmesser verkleinern und somit auch die Ingesta weiter treiben, so wird durch Zerstörung des Ansatzpunktes die Lokomotion des Speisebreies behindert (wenn nicht aufgehoben) und der Magendilatation Vorschub geleistet; während bei intaktem Pylorumuskel ein gewisser Grad der Stenose in der Regio pylorica durch vermehrte Muskelwirkung wird überwunden werden können.

Pathologische Anatomie.

Die Histologie der Wandungen dilatirter Mägen beschreibt Thiebaut³⁾, wie folgt: „die Epithelbekleidung der Schleimhaut ist fast ganz verschwunden; die Drüsen sind auf über das Doppelte vergrößert; ihre Zellen sind bald normal,

¹⁾ Anatomie pathologique du corps humain T. I. Paris 1829—1835.

²⁾ Beiträge zur Morphologie des Gaumensegels und des Verdauungsapparates. Stuttgart 1879 p. 34.

³⁾ De la dilatation de l'estomac. Paris 244 p. p.

bald mehr oder weniger durchscheinend, sehr häufig in eine feinkörnige Masse umgewandelt; das Bindegewebe zwischen ihnen ist nicht hypertrophirt, öfters mit jungen Zellen durchsetzt, welche sich bisweilen wenig von zerfallenden Pepsinzellen unterscheiden. Die Muskularis ist beträchtlich verdickt, wahrscheinlich in Folge von Vermehrung der Fasern, da weder diese selbst, noch das interstitielle Bindegewebe zugenommen haben. Das Muskelgewebe selbst ist ohne Spur einer fettigen oder kolloiden Entartung.

Durch die Ausdehnung und Vergrößerung des Magens werden die Nachbarorgane: Leber, Milz, Herz verdrängt. Zuweilen entsteht in Folge dessen durch Compression Atrophie des Pankreas, Verkleinerung der Milz (v. Ziemssen).

Symptome.

Am meisten prävalirend sind die Erscheinungen der Grundkrankheit. Das Aussehen der Kranken kann verschieden sein. Zuweilen gute Ernährung, Wohlbeleibtheit; in anderen Fällen Abmagerung, Kachexie, Gefühl der abnehmenden Körperkraft; Appetit ist meist verringert, oft aber gut; in seltenen Fällen sogar Heißhunger. Durst gewöhnlich auffallend stark in Folge mangelhafter Resorption der Flüssigkeit. Sodbrennen, Aufstossen, Druck, Völle. Erbrechen von massenhaften Speisen auf einmal, die schon vor einigen Tagen eingenommen. Klagen über Mattigkeit, Kopfschmerz, Schwindel. Geruchlose oder übelriechende Gase entweichen dem Magen, selbst brennbare. Es ist auch Kranken schon mehrmals begegnet, daß, wenn beim Cigarrenanzünden plötzlich Aufstossen erfolgte, sie sich Schnurrbart, Lippe und Nase verfengten. Constante Obstipation in Folge mangelhafter Entleerung des Magens und Abstumpfung der Nerven, welche reflektorisch eine geringe Darmperistaltik zur Folge hat. In einzelnen Fällen bestehen statt Verstopfung starke Durchfälle, welche bei inkontinentem Pylorus in Folge des reichlichen durch nichts behinderten Uebertritts saurer Magensekreta zu Stande kommen.

Die Harnmenge ist in der Regel stark vermindert bis auf 400 Cubikcentimeter in Folge mangelhafter Resorption des Magens und verminderter Aufnahme von Wasser ins Blut. Die Wasserverarmung der Organe ist es daher auch, welche die tetanischen Krämpfe in den Extremitäten erklärt, die Kussmaul bei Gastrectasie schon beobachtete.

Die Urinreaktion ist häufig alkalisch. Popoff suchte die Ursache der Alkalescenz des Urins in stark entwickelten Gährungsprozessen. Indem sich hierbei große Massen organischer Säuren entwickeln, verbrennen sie im Organismus zu Kohlensäure und werden als kohlensaure Alkalien ausgeschieden, Außerdem entwickelt sich bei solchen Prozessen viel Kohlensäure, welche aus dem Magen refoibirt und in Form kohlensaurer Alkalien ausgeschieden, ihrerseits eine alkalische Reaktion des Urins bewirken kann.

Untersuchungsmethode.

Der Unterleib ist ausgedehnt; Epigastrium hervorgewölbt; auf Druck empfindlich. Die Peristaltik des Magens ist sichtbar. Durch Palpation schlägt die Flüssigkeit an; letzteres Kunststück läßt sich jedoch nach der Mahlzeit bei jedem normalen Magen ausführen, ist daher unsicher. Wichtiger ist der gleichartig tympanitische Schall über dem mit Flüssigkeit und Luft gefüllten Magen, der sich perkutorisch nachweisen läßt. Wenn Fluctuationsgeräusch zumal 5—6 Stunden nach der Nahrungsaufnahme vorhanden, ist die Diagnose auf Ectasie ziemlich gesichert. Das plätschernde oder Succussionsgeräusch hält Kussmaul für täuschend, indem es beim leeren Magen auch durch das Aneinandererschlagen der Wände entstehen könne. v. Ziemssen schließt aus der Intensität und Regelmäßigkeit des klatschenden Geräusches mit Wahrscheinlichkeit auf bestehende Dilatation.

Die Grenzen der benachbarten Organe sind durch die Perkussion in der Regel leicht zu ziehen. Der nicht tympanitische Lungenschall hebt sich vom tympanitischen Magenschall deut-

lich ab; bei tiefer Inspiration rückt die obere Lungengrenze und die obere Magengrenze tiefer herab. Nach links ist die Grenzbestimmung schwieriger, zumal bei Milztumoren. Nach rechts überlagert der linke Leberlappen die Magengrenze, daher meist nicht abgrenzbar.

Lefshaft ¹⁾ veröffentlichte Untersuchungen über die Lage des Magens. Er kommt zu dem Resultat: daß ein mäßig umfangreicher Magen, in einer möglichst frischen Leiche untersucht, so gelagert ist, daß die Cardia dem Orte der Vereinigung der Knorpel der 6. u. 7. ten Rippe der linken Seite mit dem Rande des 9. und 10. ten Brustwirbels entspricht. In der Mittellinie des Körpers findet sich die untere Grenze des Magens am häufigsten in der Mitte des mittleren Drittels des Abstandes zwischen der Basis des Schwertfortsatzes und dem Nabel. Die untere Grenze des Magenausganges befindet sich in der Richtung einer Linie, welche genau in der Mitte zwischen der Linea sternalis und parafternalis verläuft.

Ein wichtiges diagnostisches Mittel ist die Sondenuntersuchung. Die Geschichte der Entwicklung der Magensonde und deren Bedeutung in diagnostisch-therapeutischer Hinsicht haben wir W. O. Leube zu verdanken. Er führte die Sondenuntersuchung ein, um den Tieffund des Magens zu erkennen. Penzoldt sagt: Je näher die Magensonde der Darmbeinhorizontale gefühlt wird, um so sicherer ist die Diagnose der Magenectasie.

Schreiber jedoch behauptete, daß bei ganz normalem Zustande des Magens die grosse Curvatur desselben gar nicht selten abwärts bis zur Darmbeinhorizontale gefunden wird.

Dr. Sigmund Purgesz ²⁾ hat auf eine Art hingewiesen, um den Durchmesser eines erweiterten Magens zu bestimmen. Verbindet man nämlich Schlundsonde mit einem Manometer, so zeigt dasselbe einen negativen Druck an, so lange sich die

¹⁾ Virchow's Archiv Bd. LXXXVII p. 69.

²⁾ Deut. Archiv. f. klin. Medicin Bd. XXIII p. 554—563.

Sonde in der pars thoracica des Oesophagus befindet. Sobald sie jedoch den Hiatus oesophageus passiert, wird der Druck gehoben. Markirt man sich äußerlich diesen Zeitpunkt, schiebt die Sonde alsdann behutsam vor, bis man ein Hindernis verspürt oder bis das untere Ende der Sonde durch die Bauchdecken zu fühlen ist, so kann man dadurch den Durchmesser des Magens bestimmen. Der von Purgesz intra vitam gefundene Durchmesser von 30 Cm. fand sich auch bei der Sektion bestätigt. Bei gefunden Personen ist die Sonde meist in der Gegend des Nabels palpabel. Weniger deutlich fühlbar ist sie bei starkem Panniculus adiposus. Die schon vorgekommenen Verletzungen der Mucosa durch die Sonde dürfen uns bei vorsichtiger Handhabung vor deren Anwendung nicht abschrecken.

Ziemlich sichere Resultate bietet die künstliche Auftreibung des Magens als diagnostisches Hilfsmittel.

Piorry¹⁾ füllt den Magen mit Wasser an und bestimmt dann die obere und untere Magengrenze nach der Dämpfungslinie, welche durch die Flüssigkeit erzeugt wird.

Penzoldt²⁾ fixirt diese Dämpfungsgrenze und hebert das Wasser wieder heraus zur Controle der Methode Piorry.

Diese Methoden sind jedoch nicht ausreichend. Schreiber³⁾ führte eine mit einem kleinen Kautschuckballon armirte Sonde in den Magen ein und suchte sich durch Aufblasen des Ballons über Gröfse- und Lageverhältnisse des Organs Aufschluss zu verschaffen. Die Ausführung ist complicirt und bietet unsichere Garantie.

Rosenbach⁴⁾ hat folgendes Verfahren angegeben: Führt man die Sonde in den Magen ein und verbindet dieselbe mit einem Gebläse, wie solches sich an vielen Zerstäubungsappa-

¹⁾ Piorry, die mittelbare Perkussion überf. v. Balling 1828 S. 261 ff.

²⁾ Penzoldt, Magenerweiterung 1875.

³⁾ Deut. Archiv f. klin. Medicin Bd. XIX.

⁴⁾ Klin. Vorträge aus Volkmanns Sammlung Nr. 153.

raten findet, so ist man im Stande, auf leichte Weise beliebige Luft in den Magen zu treiben. Befindet sich nun Flüssigkeit im Magen und steht das Auge der Sonde unter dem Niveau derselben, so hört man beim Einblasen der Luft und gleichzeitigem Auscultiren der Bauchwand ein großblasiges, feuchtes, oft metallisches Rasseln, mit nachschallendem deutlichem Flüssigkeitsplätschern. Ist der Magen von Flüssigkeit leer oder steht das Sondenauge oberhalb des Niveaus der Flüssigkeit oder aber ist die Sonde verstopft, so hört man nichts oder ein zischendes Geräusch. Durch Einpressen und Auspumpen von bestimmten Quantitäten Wasser in den Magen und aus demselben bei gleichzeitiger Anwendung obigen Experiments kann man über die Ausdehnungsfähigkeit, sowie Contractionsfähigkeit des Magens Aufschlüsse erhalten, wobei auch die Länge des vor den Schneidezähnen befindlichen Sondenstücks als Maßstab dient. Diese Methode gibt nur zufällige Resultate, da das Niveau des Magens durch Athmung, Bewegung, Contraction der Bauchpresse, Magenmuskulatur verändert wird.

Die besten Anhaltspunkte sind gegeben durch künstliche Auftreibung des Magens mittelst Kohlenäure.

Im Prinzip wurde diese Methode zuerst von Frerichs angewandt, von v. Ziemssen modificirt und brauchbarer gemacht. v. Ziemssen reicht das *Natr. bicarb.* und *Acid. tartar.* jedes für sich in wässriger Lösung und zwar in sehr großen Dosen. *Natr. bicarb.* 6—7 gr., von der Säure 5—6 gr. Bei wiederholter Prüfung des Magenvolumens werden stets die gleichen Mengen des Natrons und der Säure gereicht, so daß auf diese Weise ein Vergleich der Ergebnisse der Aufblähung zu verschiedenen Zeiten und eine sichere Entscheidung der Frage, ob der Magen sich in seinem Volumen verändert hat, möglich wird. Bei dieser Methode findet man, wenn man rasch nach der Einnahme der Lösung die Magengegend untersucht, den Magen straff gespannt und etwas vortretend, so daß man seine Lage und seinen Umfang meist sofort übersehen

Von der Entwicklung der Kohlenäure im Magen kann man auscultatorisch sich überzeugen. Die Perkussion ergibt einen sonoren schwach tympanitischen Schall vom Darm schall unterscheidbar.

Durch diese Methode läßt sich nicht nur die Gröfse des Magens bestimmen, sondern auch die topographische Beziehung zu den Nachbarorganen.

Bei normalem durch Kohlenäure aufgetriebenem Magen beträgt die grösste Breite der Figur: 20 Cm., wovon 5 Cm. rechts von der Mittellinie liegen; die Höhe beträgt in der linken Mammillarlinie: 12,5 Cm., in der linken Parafternallinie: 15,5 Cm., in der Medianlinie: 9 Cm., in der rechten Parafternallinie: 4 Cm. Die Aufblähung des Magens mit Kohlenäure ist aber auch ein diagnostisches Hilfsmittel bei Tumoren des Organs. Vor Allem die Tumoren des Pylorus werden durch mit der Aufblähung verbundenen Lagen- und Gestaltsveränderungen des Organs oft in überraschender Weise der palpierenden Hand zugänglich, während nur eine undeutliche Resistenz in der Tiefe den Verdacht auf einen Tumor wachrufen konnte. Leicht täuschend ist oft die starre Contraction der Magenwandungen in der Umgebung der Tumoren, welche bei Aufblähung unter dem Druck des Gases nachläßt.

Ebstein¹⁾ hat sich durch Versuche an Thieren und pathologisch-anatomische Untersuchungen überzeugt, dafs die Kohlenäureaufreibung bei inkontinentem Pylorus negative Resultat ergibt, indem dann gleichzeitig eine Aufblähung der Partien des Darmkanals zu Stande kommt. Die Spannung der Magenwände wird geringgradig, daher oft unmöglich, die Contouren des Magens durch die Inspektion auf der Bauchwand zu proziren, ja nicht einmal durch die Perkussion von den benachbarten Darmtheilen abzugrenzen. Allerdings ist man dann zur Diagnose einer Incontinenz des Pylorus berech-

¹⁾ Deut. Archiv f. klin. Medicin Bd. XXVI. p. 295.

tigt, aber nur dann sicher, wenn die dem Magen einverleibte Kohlenäure sofort durch ihr Eintreten in den Darm auch über demselben eine Aenderung, ein Tiefer- und Lauterwerden des Perkussionschalles veranlaßt.

Diagnose.

Leichtere Grade sind schwierig erkennbar. Verwechslung mit einem stark gefüllten, aber nicht dilatirten, nicht kontraktionsunfähigen Magen; Täuschung durch einen dislozirten Magen. Da der Magen nicht immer mit Bestimmtheit perkussorisch nachgewiesen werden kann, so ist nicht zu wundern, wenn Sektionen oft nachgewiesen, daß das aufgetriebene Colon, das kothangefüllte Colon, der aufgetriebene Dünndarm, die Verwechslung und Vortäuschung der Magengrenze veranlaßten.

Die endgültigen Merkmale einer Magenerweiterung sind: Stand der untern Magengrenze zwischen Nabel und Symphyse; weit nach oben und links verbreiteter tympanitischer Schall; Klatschgeräusch, Fluctuationsgeräusch und Schwappen; sicht- und fühlbare Peristaltik. Erbrechen von massenhaften, unverdauten Nahrungsubstanzen; beständige Obstipation, Anurie. Zur Unterstützung der Diagnose der Ursache der Ectasie liefern die Untersuchungen der erbrochenen Massen brauchbare Momente. Die Anwesenheit von Geschwulstpartikelchen in dem durch die Magenpumpe entleerten Inhalte gestattet schon mit ziemlicher Gewisheit eine Vermuthung von Carcinom, worüber die mikroskopische Untersuchung jedesmal den absolut sichern Aufschluß gibt.

In den entleerten Speisereften lassen sich zahlreiche Hefenpilze und Stäbchenbakterien nachweisen, indem die Gährungen konstante Begleiter krankhafter Magenectasie sind. Die höchsten Grade der Gährung sind da, wo bedeutende Stauung, starke mechanische Insuffizienz (Stenosis pylori) besteht.

Frerichs fand beim chronischen Magenkatarrh Milchäure- und Butteräuregährung; bei chlorotischen Mädchen Alkohol- und Essigäuregährung.

Hack und Demarcuay haben, gestützt auf eine Reihe von Versuchen, den Satz ausgesprochen, daß durch Bestimmung der Resorptionsstörungen uns ein einfaches Mittel an die Hand gegeben sei, in gewissen Fällen auf bestimmte anatomische und funktionelle Störungen des Magens zu schließen. Dr. Wolff in Breslau fand bei Carcinoma ventriculi bedeutende Resorptionsverlangsamung. Es liegt hier nahe, anzunehmen, daß die Resorptionsstörung einestheils durch die krebliche Degeneration, anderstheils durch die Dilatation des Magens bedingt ist.

Ob dieses Experiment auch bei Geschwüren, Katarrh zur Geltung kommt, ist noch Sache der Prüfung, wenn nicht, so günstig für die Differentialdiagnose. R. von den Velden¹⁾ hat den Salzsäuregehalt des Magensaftes an Patienten mit typischer Magenerweiterung untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, daß die Magenerweiterung, wenn Salzsäure in diesem Magensaft sich vorfand, nie durch eine carcinomatöse Pylorusstenose bedingt sei. Fand sich keine Salzsäure, so war daran entweder ein durch die Stagnation der Contenta erzeugter oder doch unterhaltener Magenkatarrh oder Fieber oder Magencarcinom schuld.

Prognose.

Die Prognose ist abhängig vom Wesen der Grundkrankheit. Wenn auch die Fortschritte der Therapie den Verlauf protrahiren, so muß überall da, wo ein Carcinom, eine Narbe im Magen zu konstatiren ist, die Prognose ungünstig gestellt werden. Ob die narbige Verengerung des Pylorus eine hochgradige ist, entscheidet meist die Wirkung einiger Auspumpungen. Wird nach denselben der Stuhlgang regelmäßig, nimmt namentlich aber allmählich auch das Körpergewicht zu, so hat man Grund, eine gute Prognose zu stellen und anzunehmen, daß die anatomische Verengerung noch keine zu hochgradige ist. Tritt nach längerer Anwendung der Magenpumpe zwar

¹⁾ Deut. Archiv f. kl. Medicin Bd. XXIII. Heft IV.

Erleichterung ein, bessern sich aber die Symptome des Magens nicht oder dauert die Verstopfung hartnäckig fort, so ist eine nicht auszugleichende Desorganisation des Magens und unheilbare Verengerung des Pfortners vorhanden d. h. entweder eine krebfige Stenosis pylori oder eine sehr bedeutende narbige Verengerung deselben.

Die Erfahrung lehrt, daß enorme Grade von Ectasieen in Folge Pylorusverengerungen eine gewisse Zeit lang gebessert werden. Die Dyspepsie verschwindet, die Beschwerden lassen nach; nach Monaten oder Jahren stellt sich aber der alte Zustand wieder ein. Wo Katarrh, Dyspepsie das Grundübel bilden, da ist eine Heilung möglich. Auch jene Fälle, welche nach schweren Krankheiten, Anämie, Chlorose zu Stande kommen, können zur Heilung gebracht werden.

Hirn- und Rückenmarkskrankheiten, Leber- und Herzaffektionen, welche eine Magenparese zur Folge haben, sind unheilbar.

Verlauf.

Es gibt eine akute und eine chronische Dilatation. Erstere ist möglich im Verlauf fieberhafter gastrischer Zustände; nach Einführung von Stoffen, die im Magen ein großes Volumen erreichen; nach Verletzungen im Unterleibe (nach Kocberlé bei der Peritonitis nach einer Ovariectomie; nach Gröfs bei der Operation eines eingeklemmten Bruches). Letztere in Folge mangelhafter Rückbildung nach akutem fieberhaftem Gastrokatarth u. f. w.

Welche Dimensionen ein erweiterter Magen annehmen kann, beweist ein Fall, der in den Annalen des städt. allgemeinen Krankenhauses zu München im Jahre 1876 zur Beobachtung kommend, verzeichnet ist. Der dilatirte Magen eines 64 J. alten Mannes ergab folgende Mafse:

Größter Längendurchmesser (durch den Nabel)	 40 Cm.
Größter Querdurchmesser senkrecht auf Längsaxe	. 17 „
Stand der Curv. major über der Symphyse	 4 „

Stand der *Curv. major* unter dem *proc. xiph.* 10 Cm.

Stand der *Curv. major* oberhalb des Nabels 4 „

Es kann aber auch jener Zeitpunkt eintreten, wo die Magenwände der Ausdehnung nicht mehr Stand halten und nothwendig eine Ruptur die Folge ist.

Dr. Chiari¹⁾ demonstirte in der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 1881 ein Präparat von spontaner Magenruptur. Bei der Obduction fand sich der Magen kolossal ausgedehnt; in demselben über 2 Klgr. Speisen nebst wenig Gas und mälsiger Flüssigkeit. Der Riss ging durch eine 15 Q.-Cm. grosse alte Narbe nach *Ulcus rotundum* bedingt. Chiari bezieht die Entstehung der Ruptur auf die Gährung der Ingesta im Magen, die dabei stattgehabte Gasentwicklung und übermälsige Ausdehnung der Magenwand. Interessant ist die Mittheilung von Leube²⁾ über zwei Fälle; wo beim Einen trotz traumatischer Verletzung der Magenschleimhaut eine Verheilung ohne Blutung und Geschwürsbildung eintrat; beim Andern, wie die Obduction nachwies, ein beträchtlicher Substanzverlust der Magenschleimhaut vollständig ohne jede Spur einer Narbenbildung zur Heilung gelangte. Die nähere Begründung dieser Möglichkeit führt L. an in v. Ziemssen's Sammelwerk Bd. VII. 2. p. 90.

Therapie.

Abgesehen von der Berücksichtigung der Causalmomente, die zuerst einer Behandlung unterzogen werden sollen, ist die mechanische Behandlung mittelst Magenpumpe werthvoll.

Der englische Wundarzt Bush war der Erste, der einen Magen auspumpte. Im 2. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wurden bereits verschiedene Arten von Magenpumpen von Sukes, Ward, Read und Weifs angegeben. Seit Kufsmaul 1867 ist die Magenpumpe zu reicher Anwendung gekommen.

Bei Atonie der *Muscularis* in Folge von zu grosser Be-

¹⁾ Wiener med. Presse 1881 p. 113.

²⁾ D. Archiv f. klin. Med. Bd. XVIII.

lastung und Ausdehnung des Magens über den Elastizitätscoefficienten hinaus; bei Polyphagie oder bei paralytischer Schwäche in der Reconvalescenz nach erschöpfenden Krankheiten ist die Anwendung der Magenpumpe vortheilhaft. Indem durch Entfernung der belastenden Massen die Aufgabe des Magens kleiner gemacht wird, setzt man seine elastischen und kontraktilen Kräfte in den Stand, sich zu erholen. Der Magen zieht sich dauernd auf einen kleinen Umfang zusammen und vermag Anfangs kleinere, später auch wieder grössere Lasten peristaltisch fortzubewegen. Wo aber eine Verengerung des Pfortners in Folge eines vernarbten Ulcus nachzuweisen, da ist es indiziert, die Funktionsfähigkeit des Magens möglichst lange unverfehrt zu erhalten und deshalb besonders der Ansammlung von Mageninhalt und der sauren Zersetzung desselben entgegen zu wirken.

Dies erreicht man durch Regelung der Diät. Bei abnormen Gährungsuständen des Magens wirkt die Auswaschung des Magens vortrefflich und die Besserung bei Magenerweiterung beruht hauptsächlich auf Wegschaffung der chemischen Anomalien: Milchsäure-, Butterfäure-, Essigfäure- und Alkoholgährung. Die Auswaschungen werden vorgenommen mit alkalischen Wässern oder mit Lösung von Natr. bicarb. 1—2%. Lichtheim¹⁾ Andeer empfehlen in neuester Zeit Resorcin 2—3%. Die sodahaltigen Wasser lösen den zähen Schleim, der im Uebermaße gebildet wird, neutralisiren die abnorme Säure und regen, wenn sie dem nüchternen Magen einverleibt, die Sekretion vom guten Magenfaft an, erleichtern somit in verschiedener Weise die Bildung eines guten Chymus.

A. Bianchi wandte in drei Fällen von chronischen Magenkrankheiten gegen abnorme Gärungen von Sekretionen, Schmerzen, Brechreiz, Aqua chloroformata (0,5—1%) als Antifermentativum und Anaestheticum an mit überraschend

¹⁾ Zeitschrift f. klin. Medicin Bd. II, p. 297

günstigem Erfolg. Die Auspülung wurde kurz und in kleinen Quantitäten gemacht.

Die Entstehung des Magengeschwürs muß nach v. Ziemssen¹⁾ durch sorgfame und frühzeitige Behandlung der Anämie und Chlorose, durch umsichtige Anordnungen behufs derjenigen Schädlichkeiten, welche zu haemorrhagischer Infiltration der Magenschleimhaut führen können, vor Allem durch sorgfältige Regulirung des diätetischen Verhaltens und Aufbesserung der Gesammternährung, so viel wie möglich verhindert werden. Ist das Magengeschwür bereits vorhanden, so ist es Aufgabe des Arztes, alle Momente, welche als Ursache der Ausbreitung des ursprünglichen Defects und als Hinderniß für die Heilung desselben zu betrachten sind, aus dem Wege zu schaffen.

Leube²⁾ räth bei den anaemischen Magenkranken zunächst die Magenaffection und erst in zweiter Linie die Anaemie der Behandlung zu unterwerfen.

In jenen Fällen, wo Anaemie Ursache des Magenkatarrhs, hat auch Solutio Fowleri gute Erfolge; ferner Salzsäure zur Beschleunigung der Umsetzung der Speisen.

Die vortrefflichen Resultate, welche die Galvanisation des Magens vor Allem in Bezug auf Regulation des Stuhles nach hartnäckiger Verstopfung, ferner bei nervösen Dyspepsien und zum Theil auch bei Ectasie des Magens liefert, sind nach der Ansicht von Kufsmaul weit weniger oder vielleicht gar nicht auf die entstehenden Muskelkontraktionen, sondern auf den umstimmenden Einfluß zu beziehen, welchen der Strom auf die nervösen Elemente des Magens ausübt.

v. Ziemssen weist ebenfalls auf die Bedeutung des konstanten Stromes bei neuralgischen Zuständen hin, während er bei andern Formen von Dyspepsie nicht so gute Resultate zu

¹⁾ Sammlg. klin. Vorträge, herausgeb. v. Volkmann Nr. 1528.

²⁾ Zeitschrift f. klin. Medicin Bd. VI. p. 189.

verzeichnen hat und sich bei gleichzeitiger Ectasie des Magens niemals von einer Verkleinerung desselben überzeugen konnte. Jedoch das subjektive Wohlbefinden der Patienten nach der Elektrisirung, hauptsächlich aber die rasche Steigerung des Appetits und der Verdauungsfähigkeit muntern immer zu neuen Versuchen auf, zumal man in hochgradigen Fällen mit der Auspumpung des Magens allein nie einen solchen Erfolg wird erzielen können.

Wo Carcinom die Verengerung des Pylorus bedingt, ist natürlich an eine Radikalheilung außer durch den chirurgischen Eingriff nicht zu denken; doch läßt sich oft sehr rasch eine momentane Besserung erreichen. Uebrigens beweisen die Resultate der Resectionen Billroths, daß die Resection im geeigneten Falle sogar geboten erscheint.

Endlich bleibt noch ein Mittel zu nennen übrig, welches in passender Form gegeben, entschieden wesentliche Besserung bewirkt. Es ist Cortex Condurango, welches sehr häufig bei Magengeschwüren und Magengeschwülsten Anwendung verdient. Der Appetit wird gehoben, die Verdauung anscheinend verbessert.

Die auf der II. med. Abtheilung zu München in den Jahren 1880, 1881 und 1882 behandelten Fälle von Gastrectasie.

Um das gesammte, den Zeitraum von drei Jahren umfassende Material von Gastrectasie, wie es sich in den Krankengeschichten der unter der Leitung des Herrn Professor Dr. v. Ziemssen stehenden II. med. Abtheilung niedergelegt findet, in übersichtlicher Weise zur Anschauung zu bringen, folgt hier in erster Linie eine nach dem Lebensalter der aufgenommenen Kranken geordnete tabellarische Zusammenstellung aller jener Fälle, die als Gastrectasie diagnostizirt und behandelt wurden.

Im Anschluß an die Tabellen werden eine Anzahl gleichfalls nach dem Alter geordneter Krankengeschichten mitgetheilt, die namentlich in Bezug auf die Ausdehnungsgrade der Mägen, fowie in anderer Hinsicht Interesse bieten.

**Tabellarische Uebersicht über die auf der II. med. Abtheilung zu München in den Jahren
1880, 1881 und 1882 als Gastrectasie behandelten Fälle.**

J.-Nr.	Alter	Geflecht	Eintritt	Grundkrankheit	Complicationen	Behandlung	Austritt	Resultat
1872	18 J.	W.	23. II. 80.	Anämie	Endometr. cervic.	Magenpumpe, Clysm	20. IV. 80.	Gebeffert
2568	19 J.	W.	1. IV. 81.	Cat. gastr. chron.		Sol. acid. hydrochl.	14. V. 81.	Geheilt
2097	19 J.	W.	1. III. 80.	Anämie		Magenpumpe	16. III. 80.	Gebeffert
8463	19 J.	W.	29. XI. 79.	Cat. gastr. chron.		Magenpumpe, Sol. Fowler.	17. I. 80.	"
9203	20 J.	W.	24. XII. 79.	Cat. gastr. chron.	Clysm c Ol Ric.	Mixt. acid.	29. I. 80.	"
1931	21 J.	W.	24. II. 80.	Anämie			10. III. 80.	Geheilt
1629	21 J.	W.	16. II. 80.	Anämie		Magenpumpe, Mixt. acid.	8. III. 80.	"
2911	22 J.	W.	14. IV. 81.	Cat. gastr. chron.		Acid. hydrochl., Ol. Ric.	17. V. 81.	"
693	22 J.	W.	21. VI. 80.	Anämie	Angina foll. Phthisis incipiens	Magenpumpe, Ol. Ric.	9. VIII. 80.	Gebeffert
1246	24 J.	W.	4. II. 80.	Cat. gastr. chron.	Bronchitis	Magenpumpe, Natr. bic.	16. III. 80.	"
8266	26 J.	W.	21. XI. 79.	Cat. gastr. chron.		Magenpumpe, Sol. Fowleri	17. I. 80.	"
9372	29 J.	W.	29. XII. 79.	Anämie	Cardialgie	Magenpumpe, Sol. Fowl.	17. I. 80.	"
4185	29 J.	M.	23. V. 80.	Cat. gastr. chron.		Tinct. Khei	22. VI. 80.	"
1451	30 J.	W.	10. II. 80.	Phthisis		Galvanisation, Mixt. acid.	10. III. 80.	"
4969	31 J.	W.	6. VII. 81.	Schnürléber	Mitralinsuffic.	Magenpumpe	12. VII. 81.	"
928	31 J.	W.	27. I. 80.	Cat. gastr. chron.	Angina foll.	Mixt. acid.	2. II. 80.	"
1257	32 J.	M.	13. II. 82.	Diabetes	Emphys. pulm.	Diät	2. V. 82.	Ungebeffert

953	32 J.	W.	4. II. 81.	Ulcus ventr.	Ischias	Magenpumpe, Faradisation	4. V. 81.	Gebeffert
2741	34 J.	W.	11. IV. 82.	Cat. gastr. chron.		Galvanisation	I. VI. 82.	"
321	35 J.	W.	10. I. 80.	Anämie		Magenpumpe, Sol. Fowl.	21. I. 80.	"
9193	37 J.	W.	23. XII. 79.	Cat. gastr. chron.	Morbus Based.	Mixt. acid.	13. I. 80.	Geheilt
8250	42 J.	W.	10. XII. 81.	Schnürleber		Electrification	17. I. 82.	Gebeffert
7977	42 J.	W.	3. XII. 82.	?		Galvanisation	29. XII. 82.	"
4170	43 J.	W.	3. VI. 81.	Cat. gastr. chr.		Acid. hydrochl.	10. VI. 81.	"
7206	44 J.	W.	30. X. 82.	Cat. gastr. chr.	Angina cat.	Galvanisation	13. XII. 82.	"
7498	49 J.	W.	13. XI. 82.	Cat. gastr. chr.		Mixt. acid.	12. XII. 82.	"
7362	54 J.	W.	6. XI. 82.	Cat. gastr. chr.		Condurango	18. XI. 82.	"
5578	55 J.	M.	2. VIII. 81.	Carcin. ventr.		Condurango, clysm.	9. IX. 81.	†
3953	58 J.	W.	31. V. 82.	Cat. gastr. chr.		Magenpumpe, Electrification	17. VIII. 82.	Gebeffert
140	59 J.	W.	5. I. 80.	Carc. ventr.		Condurango		
249	61 J.	W.	10. I. 82.	Carc. pylor.	Secund. Krebs d. Leber, d. Peritoneum.	Magenpumpe	12. II. 80.	Ungebeffert
						Condurango	21. I. 82.	†
3886	62 J.	M.	30. V. 82.	Carcin. occult.		Condurango	30. VII. 82.	†
3393	62 J.	W.	8. V. 82.	Schnürleber		Electrification, Sal. therm.	20. V. 82.	Gebeffert

Krankengeschichten.

J.-Nr. 2097.

Hochenleitner Elise, 19 J. alt, Köchin; aufgenommen 1. III. 80.
Anamnese: P. klagt seit 4 Wochen über Appetitlosigkeit, faures Aufstoßen, zeitweiliges Erbrechen. Das Erbrechen soll immer aus Speisereften bestanden haben. P. klagt ferner über Herzklopfen, Schwindel, Verstopfung. Menses unregelmäßig.

Status: Kein Fieber, Zunge belegt; Puls mäßig voll, langsam und weich. Anaemie. Normaler Herzbefund. Ueberall vesiculäres Athmen. Abdomen etwas aufgetrieben, druckempfindlich; Succussionsgeräusch.

3. III. Bei Auftreibung des Magens durch Kohlenäure ergibt sich: Länge: 33,0 Cm., Breite: 15,0 Cm., unter dem Nabel: 5,0 Cm. Erbrechen dauert fort; ziemlich stark sauer reagirende Flüssigkeit, kein Blut. Anwendung der Magenpumpe.

11. III. Auspülung des Magens hat palliativen Erfolg. Kein Erbrechen mehr.

16. III. Mel. dimissa.

J.-Nr. 8463.

Thaller Babette, 19 J. alt, Köchin; aufgenommen 29. XI. 79.
Anamnese: P. klagt seit 8 Tagen über Appetitlosigkeit, Stuhlverhaltung, Kopfschmerzen. Früher nie schwerkrank.

Status: Fieberlos; Zunge belegt; Puls weich, mäßig voll. Herzaktion verstärkt. Lungenschall normal. Abdomen etwas aufgetrieben; Epigastrium leicht empfindlich. Ord.: Tinct. Rhei.

30. XI. Kopfschmerzen; Zunge belegt.

2. XII. Besserung.

14. XII. Aufblähung des Magens:

Länge: 31,0 Cm., Breite: 15,0 Cm., unter dem Nabel: 3,5 Cm., rechts vom Nabel: 10,5 Cm.

12. I. Besserung unter konsequenter Sondenbehandlung. Gleichzeitig Sol. Fowler.

17. I. Mel. dimissa.

J.-Nr. 9203.

Penninger Rofa, 20. J. alt, Köchin; aufgenommen 24. XII. 79.

Anamnese: Vor 3 Wochen erkrankt mit Hitze und Frost.

Menses unregelmäßig. Verdauungsbeschwerden.

Status: Kräftig gebaut. Lungen frei; Herztöne rein; Abdomen mäßig aufgetrieben. Epigastrium auf Druck empfindlich. Ord: Mixt. acid.

28. XII. Erbrechen.

1. I. Besserung. Aufblähung des Magens:

Länge: 32,0 Cm., Breite: 15,0 Cm., unter dem Nabel: 5,5 Cm., seitwärts nach rechts: 9,5 Cm.

2. I. Mel. dimissa.

J.-Nr. 8266.

Pöllot Kunigunde, 26 J. alt, Köchin; aufgenommen 21. XI. 79.

Anamnese: P. klagt seit 3 Tagen über Kopfschmerzen und Fieber. Appetit gut, Stuhl in Ordnung; kein Husten; früher nie krank.

Status: Fieberlos; Zunge wenig belegt. Puls weich, mäßig voll. Herzbefund normal. Abdomen nicht aufgetrieben; nirgends Druckempfindlich. Ord.: Tinct. Rhei. Sal. therm.

11. XII. Status idem. Magenaufblähung:

Länge: 34,0 Cm., unter dem Nabel: 8,0 Cm., rechts vom Nabel: 5,5 Cm.

12. XII. Tägliche Sondirung.

16. XII. Körpergewicht: 55,000 Kgr.

3. I. „ 53,600 „

17. I. „ 52,200 „ Mel. dimissa.

J.-Nr. 953.

Schiefel Marie, 32 J. alt, Magd; aufgenommen 4. II. 81.

Anamnese: P. welche früher längere Zeit wegen Magenectasie mit der Magenpumpe behandelt worden war, klagt seit einem Jahr über Schmerzen im Leibe und Stechen auf der Brust. Appetit vorhanden bis vor

Kurzem. Stuhl angehalten. In den letzten Tagen Erbrechen.

Status: Geringe Temperatursteigerung; graciler Körperbau. Zunge wenig belegt. Puls klein. Lunge frei; Herzdämpfung verbreitert; Epigastrium und Abdomen stark druckempfindlich. Die erbrochenen Massen riechen fauer. Ord.: Acid.

12. II. Seit ihrer Aufnahme besteht kaffeesatzähnliches Erbrechen, das sich mehrmals des Tages über wiederholt.
13. II. Am schmerzhaftesten bei Druck ist die Pylorusgegend rechts vom Nabel. Ord.: Eisbeutel.
14. II. Auf Clyisma reichlicher, kothiger, hart geballter Stuhl. Leib stark eingezogen und gedämpft schallend.
20. II. Klagen über Leibschmerzen. Im Epigastrium keine Druckempfindlichkeit, keine Resistenz.
27. II. Nachts heftige Schmerzen; gegen Morgen bedeutende Mengen schmutziger Flüssigkeit erbrochen.
5. III. Bei Auspülung des Magens mit der Hebevorrichtung werden große Massen von bräunlichem Aussehen entleert. Darauf Elektrizität mit Anlegung einer großen Platte auf die Magen- und der andern auf die gegenüberliegende Rückengegend. P. verspürt bedeutende Erleichterung.
7. III. Magenaufblähung:
Von RU nach der linken Axillarlinie quer durch den Nabel: 29,0 Cm., Breitendurchmesser: 23,0 Cm.
11. III. Magenplättchern. Erbrechen großer Mengen schmutziger faurer Flüssigkeit.
19. III. Trotz Auspumpung ruhelose Nächte, Schmerzen im Leibe. Reichliche Massen mit Speisereften untermischt wurden erbrochen. Körpergewicht: 40,860 Klgr. (vor dem Auspumpen).
6. IV. Status idem. Magenpumpe und elektrischer Strom kommen zur Anwendung. Körpergewicht: 39,400 Klgr.

4. V. Magenaufblähung: die Magenwand wird sehr stark vorgewölbt; der Magenschall nimmt einen sehr grossen Umfang an. Der längste Durchmesser des Magens (von der linken Axe etwa in der Richtung nach der Spin. ant. inf. dext. beträgt 35,0 Cm. (7. III. 29,0 Cm.); grösster Querdurchmesser etwas oberhalb des Nabels: 25,0 Cm. (7. III. 29,0 Cm.); Höhe in der Mittellinie: 20,0 Cm. (7. III. 18,0 Cm.) Die Aufblähung des Magens ergibt im Vergleich mit früher (7. III), dafs der Magen nicht kleiner geworden ist. Dafs die Masse etwas gröfser ausgefallen sind, liegt wohl an den Fehlerquellen (gröfsere Köhlenfäureentwicklung, weniger Flüssigkeit im Magen). Im Uebrigen hat sich das Befinden der P., ihr Aussehen, ihr Ernährungszustand entschieden gebessert; vor Allem aber sind keine Magenblutungen mehr wiedergekehrt. Der anfängliche Verdacht auf Magenkrebs ist längst durch den Verlauf widerlegt. Vielmehr läfst sich mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dafs es sich Anfangs um Ulcus ventriculi mit Blutungen gehandelt habe. Dasselbe hatte jedenfalls schon längere Zeit bestanden und zu Pylorusstriktur und konfektiver Magenerweiterung geführt. Mel. dimissa.

J.-Nr. 5578.

Huber Peter, 55 J. alt, Tagelöhner; aufgenommen 2. VIII. 81. Anamnese: P. hat in seiner Jugend Nervenfieber gehabt; ferner Blattern durchgemacht. Er will seit $1\frac{1}{2}$ Jahren in sehr schlechten Ernährungsverhältnissen sein und an Magenbeschwerden leiden. Er klagt über saures Aufstossen; Appetit fehlt vollständig. Ferner bestehen Schmerzen in den obern Parthien des Abdomen. Stuhl immer diarrhoisch. Diese Erscheinungen haben etwa seit 6 Wochen zugenommen. Es besteht grosse Mattigkeit; Erbrechen soll nie aufgetreten sein.

Status: Kein Fieber. Zunge etwas belegt. Abdomen me-

teoristifch gespannt. Keine Dämpfung. Mäßige Druckempfindlichkeit in den obern Parthien. Wegen großer Spannung zur Zeit nichts palpabel. Herztöne rein. Ueber den Lungen rauhes vesiculäres Athmen. Kein Succussionsgeräusch. Geringes Erbrechen von Flüssigkeit. Ord.: Tinct. Rhei.

4. VIII. Magenaufblähung: Länge: 26,0 Cm., Breite durch den Nabel gemessen rechtwinklig mit der Längsaxe: 15,0 Cm., 1 Finger breit über der Symphyse. Die Sonde findet ein Hinderniß an der Cardia; wahrscheinlich Carcinom. Faradisation. Condurango.
31. VIII. Leib aufgetrieben; gespannt; im Epigastrium auf Druck empfindlich; enthält etwas freie Flüssigkeit.
9. IX. Gegen Morgen wurde P. bewußtlos; liegt mit unmotivierten Bewegungen und Grimassen des Gesichtes, kühlen Extremitäten, fast pulslos da. Beim Druck auf die Magengegend Stöhnen. Defunctus.
10. IX. Section: (Prof. Dr. Bollinger): Die Magengegend rings um die Cardia und an der vordern Wand bis zum Pylorus in eine äußerst derbe, dicke, feste Masse verwandelt. Im Fundus ein 5 Cm. im Durchmesser haltendes Stück frei von Infiltration. Knotenartige Erhebung der Schleimhaut, die aber bis auf eine kleine Excoriation am Fundus intakt ist. Auf der Serosa des Mesenteriums in den Darmföhlen zahlreiche knötchenförmige diffuse Verdickungen von weißem Aussehen. Am Ansatz des Mediastinums im Dünndarm eine ganze Zahl kleinerer bis Haselnußgroßer Knötchen. Auch das Colon ascendens vollständig mit Knoten bedeckt. Leichendiagnose: Carcinoma ventriculi, ilei et coli usque ad rectum.

J.-Nr. 3953.

Kölbl Marie, 58 J. alt, Hutmachersfrau, aufgenommen 31. V. 82.

Anamnese: P. gibt an, seit etwa 2 Monaten an Verdauungsbeschwerden zu leiden, namentlich nach Genuß von Speisen zu brechen. Dazu besteht Neigung zu Obstipation, allgemeine Schwäche, Schmerz in der Magengegend. Früher nie krank.

Status: Fieberfrei. Zunge belegt; Epigastrium auf Druck empfindlich. Magen ausgedehnt; Herz- und Lungenbefund normal.

2. VI. Erbrechen; trotz Einlauf kein Stuhl.

5. VI. Unterleib nach links etwas stärker gewölbt. Deutliches Plätschergeräusch, Magen bedeutend vergrößert; schmerzfrei. Klagen über saures Aufstoßen.

Länge: 33,0 Cm., Breite: 19,0 Cm., Höhe senkrecht durch den Nabel: 20,0 Cm.

16. VI. Erbrechen; Stuhl spontan. Magenauspülung. Körpergewicht 53,680 Klgr.

18. VI. Nach jeder Auspülung Erleichterung. Körpergewicht: 54,240 Klgr.

25. VI. Kein Erbrechen. Körpergewicht: 55,900 Klgr.

2. VII. Saures Aufstoßen. „ 56,000 „

9. VII. Aussehen und Ernährungszustand gebessert. Körpergewicht: 56,180 Klgr.

16. VII. Die Auspülungen des Magens sind regelmäßig fortgesetzt worden mit allmählicher Verlängerung der Intervalle. P. fühlt sich wohl. Körpergewicht: 58,880 Klgr.

14. VIII. Bei gleichzeitiger Elektrifikation bessert sich der Appetit.

17. VIII. Mel. dimissa.

J.-Nr. 249.

Oeffner Klara, 61 J. alt, Dienstmansfrau; aufgenommen

10. I. 82.

Anamnese: P. welche früher schon in Behandlung, will seit 3 Tagen das Genossene stets wieder erbrechen und klagt über Schmerzen im Epigastrium. P. gibt auch an, daß sie Eckel vor Fleischspeisen habe und nur

mehr flüssige Nahrung vertragen könne. Auch will sie in der letzten Zeit bedeutend abgemagert sein.

Status: Bedeutende Macies; Abdomen aufgetrieben; im Epigastrium brettartige Resistenz. Herztöne unrein; geringe Bronchitis.

18. I. Verfallender Gesichtsausdruck. Epigastrium Druckempfindlich. Mandelgroßer harter Knoten deutlich fühlbar. Condurango.
21. I. Soporartiger Zustand; Leib stark gespannt, in der ganzen rechten Hälfte gedämpft. Sensorium benommen. Defuncta.
22. I. Section: (Prof. Dr. Bollinger): Der Magen ziemlich stark erweitert, schmutzig grauröthlicher Inhalt. An der pars pylorica ein Mannshandgroßes zerfressenes ringförmiges Geschwür mit aufgeworfenen Rändern und zerfressenem Grunde. Pylorus selbst bis zum Umfang eines kleinen Fingers stenofirt. Magenwand an der geschwürigen Stelle krebzig infiltrirt, speckig glänzend.

Leichendiagnose: Magencarcinom.

J.-Nr. 3886.

Eschenauer Anton, 62 J. alt, Tagelöhner aufgenommen 30. V. 82.

Anamnese: P. leidet seit einem $\frac{1}{2}$ Jahr an häufigem Aufstoßen, Uebelkeit, galligem Erbrechen und ist seitdem beträchtlich abgemagert. Ebenso lange bestehen Diarrhoen, doch hat P. nie Schmerzen von Seiten des Magens empfunden. Appetit gering, namentlich Eckel vor Fleischspeisen. P. hat sich bei der Arbeit immer sehr matt gefühlt.

Status: Abgemagerter mittelkräftiger Körper. Haut blaß, welk. Herzdämpfung normal. Rechte Lungen spitze kürzer, als die linke schallend. Leib weich, nirgends Druckempfindlich; überall tympanitisch. Succussionsgeräusch. Magenschall über 3 Finger breit unter den Nabel herabreichend.

7. VI. Körpergewicht: 42,080 Klgr. Condurango.
 20. VI. „ 41,760 „
 29. VI. „ 39,940 „ Kein Tumor fühlbar.
 Größter Querdurchmesser des Magens: 35,0 Cm.
 6. VII. Körpergewicht: 38,440 Klgr.
 19. VII. Magert zusehends ab; nimmt sehr wenig Nahrung zu sich.
 28. VII. Rapider Kräfteverfall. Defunctus.
 Diagnose: Carcinoma occultum (ventriculi?). Section?

Im Ganzen wurden in den Jahren 1880, 1881 und 1882
 194 Magenranke behandelt.

Davon waren:

Cat. gastr. acut. et chron.	130 Fälle.
Carcinoma ventriculi	16 „
Ulcus ventriculi	15 „
Gastrectasie	33 „

Von den 33 Gastrectasien waren 5 männlichen, 28 weiblichen Geschlechts.

Das Alter war vertreten vom 18.—62. Lebensjahre.

Als aetiologische Momente sind anzuführen:

Cat. gastr. chron	in 15 Fällen.
Anämie	7 „
Carcinom	4 „
Schnürleber	3 „
Diabetes	1 „
Phthisis	1 „
Ulcus	1 „
?	1 „

Von diesen 33 Gastrectasien wurden:

Geheilt entlassen	5 Fälle.
Gebessert entlassen	23 „
Ungebessert	2 „
Gestorben sind	3 „

Epikrisis.

Auffallend muß uns in der Statistik erscheinen die geringe Zahl von Magenerweiterung auf männlicher Seite, gegenüber den 28 Fällen weiblichen Geschlechtes.

Gewöhnlich ist es der Alkoholismus resp. der Branntweingenuss, der den chronischen Magenkatarrh bedingt und dem in weitaus gröfserer Zahl die Männer unterworfen sind. Allein wenn wir in Betracht ziehen, in welch' naher Beziehung chronischer Magenkatarrh und Anaemie zu einander stehen, so wissen wir auch, dafs die weiblichen Individuen schon vermöge ihrer Disposition am meisten davon befallen werden. Und gerade der Beruf dieser 28 Fälle — 21 sind Köchinnen, die übrigen Näherinnen — beweist uns, welchen Einfluss er auf die Gesamtkonstitution, beziehungsweise auf Ernährungs- und Verdauungsorgane auszuüben vermag. Die mangelhafte Bewegung in frischer Luft, der Aufenthalt in den gewohnten beschränkten Räumen lassen die der Anämie zu Grunde liegenden Störungen zur Entwicklung kommen. Durch die allgemeinen Blutkrankheiten können die Beschwerden so grofs werden, dafs sie die primäre Krankheit verdecken. Die vielen medikamentösen Substanzen, die zur Bekämpfung des krankhaften Zustandes dem Magen einverleibt werden, üben einen hohen Einfluss auf die Magenschleimhaut aus und unterstützen das Zustandekommen des chronischen Magenkatarrhs. Zudem sind gerade die Köchinnen darauf angewiesen, heisse Getränke wie Suppe etc. dem Magen zuzuführen, durch welche so viele Magenkrankheiten bedingt sind. Die schädliche Gewohnheit, täglich diese heifsen Stoffe zumal mit dem nüchternen Magen in Berührung zu bringen, führt allmählig durch den täglich sich wiederholenden Reiz zur chronischen Entzündung, aus der alsdann das Geschwür hervorgeht.

Der chronische Magenkatarrh kann auch als Komplikation jener Zustände auftreten, die mit dauernder Hyperämie der Magenwandung einhergehen; so bei Stauungen im V. cavasystem

durch Herzkrankheit bedingt, wodurch wenigstens eine Prädisposition zu Entzündungen gegeben ist (Vergl. Fall Nr. 8463).

Uebrigens wenn auch Einer der besten Diagnostiker, wie v. Ziemssen, am Krankenbette dieser Patienten gestanden, so muß doch angenommen werden, daß im einen oder andern Fall zur Zeit eine bestimmte Diagnose unmöglich war, indem die Hauptkrankheit unter dem Bilde des chronischen Magenkatarrhs vorgetäuscht wurde. Ist es ja Sache der Erfahrung, daß eine absolute Diagnose oft erst nach langer Beobachtung des Falles möglich ist.

Nicht so selten verläuft ein Magengeschwür unter den Erscheinungen des chronischen Magenkatarrhs durch kürzere oder längere Zeit, ja selbst bis zur Heilung. Ebenfalls täuschend sind Störungen der Innervation des Magens; selbst bei Carcinom können die charakteristischen Symptome fehlen, indem sie ähnlicher sind dem chronischen Magenkatarrh und die Diagnose schwierig machen. Und wenn wirklich Geschwülste in der Magenwand vorhanden sind, so bedingt ihr Wachsthum in der Umgebung eine chronische Entzündung, von der ein Theil dem complizirenden Magenkatarrh zugeschrieben wird.

Wenn wir also das Gefagte als richtig annehmen müssen, so läßt sich in der Statistik die Zahl des chronischen Magenkatarrhs vielleicht um etwas reduzieren und dasselbe dem Ulcus oder Carcinoma ventriculi zuzählen.

Gerade so kann die Diagnose zwischen Carcinom und Ulcus in Frage treten und erst durch den Verlauf beantwortet werden. (Vergl. Krankengesch. Nr. 951.)

Keine Ausnahme macht das Alter der von den verschiedenen Grundkrankheiten heimgesuchten Individuen. Gerade in den Pubertätsjahren junger Mädchen faßt die Chlorose Grund und Boden; in unserer Zusammenstellung reicht sie vom 18. — 35. Jahre. Das Carcinom, das meistens zwischen dem 60. und 70. Jahre angetroffen, war vertreten im 59. 61. und 62. Jahre.

In den Jahren, wo der chronische Magenkatarrh zum Ausbruch gelangen kann, disponiren auch die demselben zu Grunde liegenden Krankheitsverhältnisse zur Bildung eines Magengeschwürs (Fall 953).

Wie trotz subjektiven Wohlbefindens und zweckmässiger Behandlung durch gestörte Verdauungsprozesse der menschliche Körper an Gewicht verlieren kann, geht hervor aus Fall Nr. 8266; innert 30 Tagen eine Gewichtsabnahme von 3 Kilogramm (Cat. gastr. chr.); Fall Nr. 3886 innert 2 Monaten eine Gewichtsabnahme von $3\frac{1}{2}$ Kilogramm (Carcinom). Jedoch läßt sich häufig bei zunehmender Besserung wieder eine Gewichtszunahme konstatiren, wie Fall Nr. 3953, wo im Verlauf von 36 Tagen die Körper schweren um 5.200 Kilogramm gestiegen (Cat. gastr. chr.).

Von Interesse wäre vielleicht ein Sektionsbericht über Fall Nr. 3886, welcher aber leider fehlt.

In Bezug auf Symptomatologie und Therapie sind in den Krankengeschichten so ziemlich jene wesentlichen Punkte enthalten, wie wir sie oben weitläufiger besprochen haben.
